



# Organiser le pâturage en élevage allaitant

## Les objectifs du pâturage :

- Assurer une alimentation suffisante au pâturage
- Récolter un maximum de fourrages pour la période d'hivernage
- Rentrer des animaux en bonne santé

## Anticiper pour s'organiser...

Pour disposer toute l'année de fourrages de bonne valeur alimentaire, il faut prévoir en cours d'hiver l'organisation de la campagne de pâturage.

Nombre	Catégories	Valeur	Total
	VACHES + Veaux	x 1,00 =	
	Taureau	x 1,00 =	
	VACHES	x 0,85 =	
	M ou F = 2 ans	x 0,80 =	
	M ou F 1 à 2 ans	x 0,60 =	
	M ou F - 1 an	x 0,30 =	
TOTAL UGB Pâturant :			

L'objectif est de recenser les différentes catégories du cheptel, de leur affecter un coefficient « UGB » spécifique afin déterminer le « TOTAL UGB pâturant »

## Fiche 32

Etape N°1 : recenser les effectifs (tableau 1)

Etape N°2 : décrire le parcellaire (tableau 2)

	Prairies Pâturées ou Pâturées fauchées	Surface Pâturable	Surface Fauchable
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL			

Cette étape est importante pour bien appréhender les ressources pour le pâturage. Sur chaque parcelle des informations peuvent être apportées (surface, type de prairie, orientation (fauche / pâturage possible), potentiel...

Selon la date de vêlage, le potentiel des prairies et le niveau de fertilisation, la surface pour un couple mère/veau variera de 20 à 35 ares au printemps et 35 à 50 ares en été.

	Printemps	Eté	Automne
1-Très bonnes prairies	20 à 25 ares / UGB	35 à 40 ares / UGB	45 à 50 ares / UGB
2-Prairies moyennes	25 à 30 ares / UGB	40 à 45 ares / UGB	50 à 55 ares / UGB
3-Mauvaises prairies	30 à 35 ares / UGB	45 à 50 ares / UGB	55 à 65 ares / UGB



En fonction de la surface disponible et de leur potentiel, les parcelles pourront être affectées par lots d'animaux et par période.

### Gérez au mieux : Printemps

Chargement printemps (objectif) :	<input type="text"/>			
Surface nécessaire :		Object Charg	x Nbre UGB	= <input type="text"/> ha pâturés
Surface à faucher printemps :		Surf totale -	Surf nécessaire	= <input type="text"/> ha à faucher

- Mettre dehors le plus tôt possible dès que l'herbe atteint 15 cm de hauteur (en fonction de la météo bien sûr) ;
- Ne pas retarder la mise à l'herbe au delà du stade 25 à 30 cm de l'herbe ;
- Quittez la parcelle ou augmentez la surface dès qu'il ne reste que 6 -7 cm d'herbe (plus tôt si humide en fonction du piétinement) ;
- Récolter les excédents entre le 15 et le 30 Mai. ;
- Plus vous récolterez tôt, meilleure sera la qualité et la repousse !

### Gérez au mieux : Eté

Chargement printemps (objectif) :	<input type="text"/>			
Surface nécessaire :		Object Charg	x Nbre UGB	= <input type="text"/> ha pâturés
Surface à faucher printemps :		Surf totale -	Surf nécessaire	= <input type="text"/> ha à faucher

- Pâturage tournant : il faut laisser à l'herbe le temps de repousser sans jamais dépasser 8 à 9 semaines de temps de repos ;
  - Full Grass (une seule parcelle pour tous les animaux) : si possible augmenter progressivement les surfaces en fonction des besoins des animaux ;
- N'ayez pas peur de laisser meugler les animaux jusqu'à 2 jours avant de changer de parcelle ou d'agrandir la surface (hauteur d'herbe 5 cm).

### Gérez au mieux : Automne

Chargement printemps (objectif) :	<input type="text"/>			
Surface nécessaire :		Object Charg	x Nbre UGB	= <input type="text"/> ha pâturés
Surface à faucher printemps :		Surf totale -	Surf nécessaire	= <input type="text"/> ha à faucher

- Début octobre sevrer les veaux, rentrer les animaux pour lesquels on souhaite voir de bonnes croissances (ou complétez au pâturage) ;
- Mettre à disposition des animaux des fourrages grossiers secs (Foin ou paille) selon leur alimentation future en stabulation (transition). Evitez le sur-pâturage et le piétinement excessif en rentrant les vaches quand il reste 6 à 7 cm d'herbe ou plus (La prairie redémarrera mieux au printemps suivant).

### Point récolte et gestion des excédents

- Théoriquement, si l'on est autonome à l'été, il doit y avoir des excédents à récolter au printemps.
- Si ce n'est pas le cas, il faudra donc prévoir d'affourager les animaux durant l'été !



- Il faut récolter l'herbe au bon stade pour disposer d'un fourrage de qualité qui limitera les apports de concentrés.
- Le stade optimum alliant rendement et qualité est le stade épis encore dans la gaine !
- Le mode de récolte est à adapter en fonction de la météo au moment du bon stade !

Ne jamais dépasser le stade épié, à floraison, la valeur du foin se rapprochera plus d'une «bonne paille».

Etape N°3 :  
Organiser le  
parcellaire pour  
les différentes  
périodes

La récolte des  
excédents :

Trois solutions  
pour la récolte :